

QUESTIONS ET REPONSES SUR L'EPIDEMIE DE POLIOMYELITE AU CONGO - NOVEMBRE 2010 DRAFT ZERO

Que se passe-t-il ?

Il ya actuellement au Congo une épidémie de poliomyélite qui a commencé à Pointe Noire. le premier cas daterait de début octobre 2010. Des cas observés à Dolisie, Kayes, Bouenza, Brazzaville, et Mvouti laisse penser que l'épidémie pourrait se répandre dans tous le pays.

Quel est l'âge des personnes atteintes ?

La plupart des cas surviennent chez le jeune adulte : pour ceux dont l'âge est disponible pour l'instant (43), 33 se situent entre 15 et 25 ans. Seulement un patient a en dessous de 1 an, trois sont entre 7 et 13 ans et cinq entre 26 et 58 ans. Cette maladie atteint les adultes au Congo parce que très probablement ils n'ont pas été ou ont été incomplètement vacciner lorsqu'ils étaient enfants; il ya une vingtaine d'années.

D'où est partie l'épidémie ?

Comme Le Congo a eu son dernier cas de poliomyélite en 2000, cette épidémie vient probablement d'un pays voisin. Et des recherches sont en cours pour déterminer son origine.

Quels sont les signes de la maladie ?

La maladie commence par des courbatures, des vomissements puis une paralysie progressive des membres inférieurs et ou supérieurs chez des personnes non ou insuffisamment vaccinées. La personne doit alors être amenée au centre de santé ou hospitalier le plus proche.

Comment prévenir la maladie ?

Tout d'abord **en se vaccinant** contre le polio virus sauvage en recevant 3 doses successives de vaccin polio oral à deux ou trois semaines d'intervalle. Chaque personne recevra 2 gouttes de vaccin dans la bouche à chacun des 3 passages. Toute la population est concernée, **100% de la population** sera vaccinée y compris les enfants récemment vaccinés. **En se lavant les mains** avec de l'eau et du savon avant de manger et chaque fois après avoir été aux toilettes. Il est aussi impératif de demander aux populations et particulièrement aux jeunes enfants de ne pas faire « caca » à l'air libre, **l'usage de latrines** est recommandé ou son équivalent (enterrer les selles, nettoyer autour des habitations, etc.) Il est aussi recommandé de consommer de l'eau potable obtenue en faisant bouillir l'eau ou en javellisant celle-ci (1 bouchon pour 5 litres ou 10 litres?).

Pourquoi vacciner les adultes ?

Parce que lorsqu'un adulte n'a pas été vacciné durant sa petite enfance, le virus de la polio peut entraîner le décès de la personne.

Est-ce que les adultes déjà vaccinés sont concernés ?

Oui, tous les adultes déjà vaccinés lorsqu'ils étaient enfants doivent recevoir les 2 gouttes de vaccin oral, à 2 ou 3 semaines d'intervalle, à chacun des 3 passages. Les adultes ayant reçu du vaccin polio injectable quand ils étaient enfants doivent aussi recevoir les 2 gouttes à chacun des 3 passages. Durant cette épidémie, on est mieux mieux protégé en recevant les deux gouttes même si on été vacciné par piqûre il y a quelques jours, il n'y aucun risque de surdosage.

Quelle est la réponse du gouvernement Congolais et des partenaires à l'épidémie ?

Le gouvernement avec l'appui de ses partenaires a procédé très rapidement à la prise en charge des cas dans les structures sanitaires. Pour prévenir l'extension de l'épidémie, il va organiser une vaccination de toute la population, adulte et enfants, suivant le calendrier suivant :

- 1^{er} passage Polio:
 - Pointe-Noire – Kouilou: 12-16 Novembre 2010
 - Tout le pays excepté PNR et Kouilou: 18-22 Novembre 2010
- 2^{eme} passage Polio:
 - Tout le pays: 03-07 Décembre 2010 (intervalle 3 semaines PNR & Kouilou, 2 semaines le reste du pays)
- 3^{eme} passage Polio:
 - Tout le pays: 26-30 Décembre 2010 (intervalle 3 semaines sur tout le pays)

Rappel : Pour mieux protéger les enfants, une campagne de vaccination contre la rougeole aura lieu du 15 au 20 décembre 2010 dans le tout le pays. Tous les enfants de 6 à 59 mois recevront une piqûre.